

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah neutrofil dengan kadar C Reaktif Protein pada penderita febris anak di RS. Bhayangkara Kediri.

#### **6.2 Saran**

Setelah dilakukan penelitian dan mendapatkan hasil, maka saran yang dapat penulis dan peneliti berikan adalah :

1. Perlu dilakukan pemeriksaan jumlah neutrofil dengan kadar C Reaktif Protein sebagai satu paket pemeriksaan untuk mengetahui keadaan pasien pada gejala febris.
2. Melakukan pemeriksaan kadar C Reaktif Protein berulang untuk monitoring keberhasilan terapi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai hubungan kadar C Reaktif Protein dengan infark miokard. Mengingat akhir-akhir ini banyak penelitian yang memfokuskan penggunaan C Reaktif Protein untuk memperkirakan prognosis pasien-pasien dengan 'unstable angina' yang berat.

