

BAB 5

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pada hasil pengkajian yang telah dilakukan didapatkan beberapa kesenjangan di antaranya pada pemeriksaan kehamilan tidak dilakukannya semua standart pelayanan Antenatal Care yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan di antaranya tidak dilakukan pemeriksaan VDRL dan imunisasi TT lengkap.
2. Identifikasi terhadap diagnosa atau masalah diperoleh diagnosa pada kasus ini yaitu G_{IV}P₃₀₀₀₃ uk 40 minggu 3 hari, tunggal, hidup, letkep, intrauterin, jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik. Sedangkan pada kasus tidak ditemukannya masalah tetapi adanya keluhan his palsu atau Braxton hicks dan nyeri punggung. Diagnosa pada kasus intranatal care G_{IV}P₃₀₀₀₃ UK 41 minggu 6 hari, tunggal, hidup, letkep, intrauteri, jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase aktif, Sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu nyeri kontraksi pada perut dan ibu lemas karena tidak ada asupan nutrisi yang dikonsumsi. Dukungan yang dapat diberikan kepada klien yaitu dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dirinya dan janinnya juga menginformasi mengenai proses dan kemajuan persalinan. Diagnosa pada kasus

postnatal care P₄₀₀₀₄ post partum 3 jam, sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu ibu masih merasakan mulas (after pain).

3. Identifikasi diagnosa atau masalah potensial didapatkan masalah potensial tidak adanya kasus yang mengarah pada patologis.
4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter dan/untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Pada tahap ini didapatkan adanya batasan serta kewenangan dalam proses penanganan persalinan antara bidan dengan dokter SPOG
5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan asuhan kebidanan pada klien dengan persalinan fisiologis tidak semua di lahan tertuang dalam teori. Artinya terdapat kesenjangan yang membutuhkan penelitian yang mendalam.
6. Implementasi atau melakukan tindakan didapatkan asuhan yang menyeluruh dapat mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap klien. Terdapat kesenjangan antara teori dengan dengan kasus, tetapi masih adanya kebijakan yang di berlakukan dalam setiap tempat pelayanan untuk tetap meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kesakitan dan kematian pada setiap pasien yang datang ke tempat pelayanan tersebut.
7. Evaluasi pada kasus ini didapatkan kehamilan, persalinan dan masa nifas yang fisiologis dan tidak adanya tanda – tanda yang mengarah pada patologis.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah

5.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan pendidikan atau institusi memberikan fasilitas literature yang lebih lengkap dan terbaru supaya hasil karya tulis ilmiah lebih baik lagi.

5.2.2 Bagi Lahan Praktek

Perlunya peningkatan dalam pelayanan kebidanan yaitu dengan cara feteksi dini terhadap munculnya tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, bersalin dan nifas, terutama pada klien yang mempunyai riwayat penyakit dan yang memiliki faktor resiko tinggi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas.

5.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan praktek dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan dan nifas sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif