### **BAB 5**

### SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Asuhan kebidananan kehamilan,persalinan dan nifas pada Ny.K di RB Budi Mulya Gresik dapat diambil simpulan bahwa pada:

- Pengumpulan data dasar pada kehamilan terdapat kesenjangan yaitu tidak dilakukan pemeriksaan PMS, pasien tidak minum tablet Fe, pasien mengkonsumsi jamu, tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium urin, pasien tidak pernah USG. Nifas pada pola nitrisi pasien tidak boleh makan ikan, telur, ayam dan daging
- 2. Interpretasi data dasar pada kehamilan diperoleh diagnosa GIIP10001 UK 38 minggu 3 hari, tunggal, hidup, letak kepala U, intrauteri, keadaan jalan lahir normal, keadaan ibu dan janin baik. Masalah sering kencing. Kebutuhan HE penyebab sering kencing dan personal hygiene. Persalinan diperoleh diagnosa GIIP10001, UK 40 minggu 6 hari, tunggal, hidup, letak kepala, kesan jalan lahir normal, keadaan umum ibu dan janin baik dengan kala 1 fase aktif. Masalah cemas. Kebutuhan KIE tentang keadaannya saat ini, dukungan emosional, dan KIE teknik relaksasi. Nifas diperoleh diagnosa P20002 post partum 6 jam. Masalah nyeri luka jahitan. Kebutuhan mobilisasi, pola eliminasi, dan nutrisi.
- 3. Identifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan, dan nifas tidak ada diagnosa/masalah potensial.

- 4. Identifikasi dan penetapan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera pada kehamilan, persalinan, dan nifas tidak ada.
- Rencana asuhan pada kehamilan, persalinan dan nifas tidak terdapat kesenjangan
- 6. Pelaksanaan perencanaan pada kehamilan dan nifas tidak terdapat kesenjangan, sedangkan pada persalinan terdapat kesenjangan yaitu tidak dilakukan IMD, penyuntikan Hepatitis dilakukan pada kunjungan hari ke-5 setelah persalinan dan pencatatan partograf dilakukan setelah persalinan selesai.
- 7. Evaluasi pada perencanaan dan pelaksanaan pada kehamilan berjalan dengan normal karena masalah yang dialami pasien dalam keadaan fisiologis yaitu sering kencing dan kebutuhan yang diberikan sesuai dengan masalah. Persalinan juga berjalan dengan normal yaitu waktu yang dibutuhkan dari ibu datang pembukaan 4 sampai pembukaan 10, waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam 30 menit. Nifas berjalan dengan normal karena keluhan yang dirasakan ibu adalah nyeri pada luka jahitan yang termasuk dalam keadaan fisiologis.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

# 1. Bagi lahan praktek

Diharapkan lahan praktek dapat meningkatkan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan dan nifas.

# 2. Bagi penulis

Diharapkan belajar lebih giat untuk meningkatkan kemampuan teori dan penerapan skill dalam praktek asuhan kebidanan kehamilan, persalinan dan nifas.