

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada pengkajian kehamilan didapatkan data bahwa ibu mengalami keluhan kaki bengkak dan anemia ringan pada usia kehamilan 35 minggu 1 hari. Pada persalinan dengan usia kehamilan 37 minggu 4 hari ibu mengeluhkan kenceng-kenceng dan mengeluarkan lendir bercampur darah, namun belum mengeluarkan air ketuban. Pada nifas ibu dengan keluhan perut terasa mulas dan capek. Pada bayi baru lahir, bayi hanya diberi minum ASI tanpa ditambah susu formula.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan dapat menyediakan beragam jumlah referensi yang dapat menunjang pemberian asuhan kebidanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan anak didik tentang asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

5.2.3 Bagi Institusi Tempat Penelitian

Dapat meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan kehamilan, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sesuai dengan evidence based.

5.2.4 Bagi Masyarakat

Perlu adanya peran serta masyarakat untuk sadar akan pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan keikutsertaan keluarga dalam proses persalinan, nifas dan bayi baru lahir agar deteksi dini dapat dilakukan secara tepat danantisipasi adanya komplikasi dapat segera dilakukan.

5.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu adanya pemeriksaan subyektif tentang pergerakan janin pada setiap pasien ANC, pemeriksaan kadar Hb dan mengatasi anemia pada ibu hamil, Penulisan partograf sebaiknya dilakukan saat observasi selesai, Vitamin K dan salep mata sebaiknya diberikan 1 jam setelah bayi lahir.