

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Kehamilan

Pada kasus ini di dapatkan hasil pengkajian ibu hamil mengalami keputihan pada usia kehamilan 8 bulan. Berdasarkan pemeriksaan kehamilan di dapatkan bahwa hasil pemeriksaan yang di lakukan yaitu keadaan ibu baik, pemeriksaan fisik dalam bats normal, status TT lengkap, pemeriksaan laboratorium HB dalam batas normal, terdapat ketidaksesuaian yaitu pemeriksaan HIV tidak di lakukan karena klien tidak mau mengantri karena ibu sedang bekerja. Setelah di lakukan pemeriksaan di dapatkan Assasment ibu: G2P1A0 UK 37 minggu 4 hari dengan keputihan. Pada kehamilan ibu di berikan HE tentang penyebab keputihan dan upaya penanganan keputihan.

5.1.2 Persalinan

Pada persalinan ibu sudah tidak mengalami keputihan ibu mengeluhkan perutnya kenceng-kenceng dan sudah mengeluarkan lendir bercampur darah. Setelah di lakukan pemeriksaan di dapatkan hasil pemeriksaan klien datang dengan mengeluh kenceng-kenceng dan mengeluarkan lendir bercampur darah setelah di lakukan pemeriksaan dalam pembukaan 4 cm, eff 50%, ketuban (+), denominator UUK, HII, tidak ada molase, dan tidak ada bagian kecil di samping janin, dan persalinan berlangsung normal. Setelah di lakukan pemeriksaan di

dapatkan Assesment ibu : G2P1A0 UK 39 minggu 5 hari inpartu kala 1 fase aktif. Pada persalinan ibu di berikan asuhan sayang ibu seperti mengajarkan ibu untuk relaksasi dan asuhan sayang ibu.

5.1.3 Nifas

Ibu mengeluhkan mulas pada perutnya. Setelah di lakukan pemeriksaan keadaan ibu baik pemeriksaan TTV dalam batas normal dan pemeriksaan fisik dalam batas normal. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan Assesment P1A0 postpartum 2 jam fisiologis. Pada ibu nifas ibu di berikan HE tentang penyebab mulas yang di alami oleh klien merupakan hal yang fisiologis karena adanya involusi pada uterus.

5.1.4 Bayi Baru Lahir

Pada bayi baru lahir di dapatkan bayi di berikan ASI eksklusif. Berdasarkan pemeriksaan pemeriksaan fisik dalam batas normal tidak ada perdarahan pada tali pusat. Dari pemeriksaan di dapatkan Assesment Neonatus Cukup bulan Sesuai Masa Kehamilan usia 2 jam. Sedangkan pada bayi bari lahir di berikan penanganan pencegahan kehilangan panas, di berikan vitamin K 1mg dan di berikan salep mata tetrasiklin 1%. Namun terdapat ketidaksesuaian yaitu pemberian imunisasi HB0 tidak di berikan 1 jam setelah pemberian vitamin K namun di berikan pada saat kunjungan hari ke-3 dengan tujuan agar ibu kontrol ulang ke BPS sehingga tenaga kesehatan dapat memantau keadaan ibu dan bayinya.

5.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul Asuhan kebidanan pada Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Neonatus, penulis memberi saran :

5.2.1 Bagi Institusi pendidikan

Mohon pengadaan sarana buku-buku sesuai dengan bidang pendidikan seperti halnya buku-buku edisi baru kebidanan beserta asuhan yang diperlukan, sehingga mempunyai wawasan yang lebih luas.

5.2.2 Bagi tenaga kesehatan

Diharapkan lahan praktek sebagai tempat penerapan ilmu yang didapatkan mahasiswa, bisa menerapkan asuhan kebidanan sesuai dengan standart asuhan kebidanan dengan maksimal, guna meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat.

5.2.3 Bagi penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu semaksimal mungkin sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan *Continuity of Care*.