

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pada pengumpulan data dasar kehamilan dengan nokturia terjadi pada ibu hamil primigravida yang memasuki usia kehamilan trimester III.
2. Pada langkah interpretasi data dasar didapatkan diagnosa G1 P₀₀₀₀₀, UK 38 minggu 5 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan ibu dan janin baik dengan nokturia. Diagnosa pada kasus intranatal care GI P₀₀₀₀₀ UK 40 minggu 5 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, kesan jalan lahir normal, keadaan ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase aktif. Diagnosa pada kasus postnatal care P10001 post artum 6 jam fisiologis.
3. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial tidak ada komplikasi yang terjadi pada kasus ibu dengan nokturia baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas.
4. Identifikasi Kebutuhan Akan Tindakan Segera/Kolaborasi/Rujukan tidak ditemukan kebutuhan yang harus dilakukan segera pada kasus ibu dengan nokturia baik dalam kehamilan, persalinan dan nifas.
5. Pada langkah perencanaan asuhan secara menyeluruh, antara teori dan kasus tidak dimunculkan kesenjangan dalam kehamilan, persalinan dan nifas.

6. Implementasi atau melakukan tindakan asuhan yang menyeluruhkan mencerminkan keefektifan asuhan kebidanan yang diberikan terhadap klien. Tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus. Baik dalam kehamilan dan nifas, terdapat kesenjangan pada persalinan tetapi masih ada kebijakan yang diberlakukan dalam setiap tempat pelayanan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi, serta menurunkan angka kematian dan kesakitan pada setiap klien yang dapat ketempat pelayanan tersebut.
7. Pada langkah mengevaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan asuhan kebidanan, pada kehamilan peneliti tidak memberikan tentang cara personal hygiene, namun pada kasus ibu tidak terjadi infeksi saluran kencing karena ibu kooperatif sering mengganti celana dalam dan menjalankan saran yang dianjurkan peneliti untuk cara mengatasi sering kencing. Antara teori dan kasus tidak ditemukan kesenjangan dalam kehamilan, persalinan dan nifas.

6.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Kebidanan kehamilan, persalinan, nifas penulis memberikan saran :

6.2.1 Bagi Institusi

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka dan referensi penelitian selanjutnya.

6.2.2 Bagi Lahan Praktek

Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan atau bidan dalam menegakkan diagnosa melalui pengumpulan data dasar, pemeriksaan secara

tepat sehingga dapat diambil tindakan untuk mencegah terjadinya komplikasi.

6.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menggali ilmu lebih dalam lagi dalam memahami teori sehingga dapat diterapkan di lahan dan mempelajari lebih lanjut tentang teori yang berhubungan dengan asuhan kebidanan pada nokturia sehingga dapat menerapkan dan memberikan asuhan pada ibu dengan komprehensif.