

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perbedaan tingkat nyeri *Arthritis Rheumatoid* dengan *Osteoarthritis* di Panti Tresna Werdha Hargodadali Surabaya dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Tingkat nyeri pada lansia *Arthritis Rheumatoid* sebagian besar ada 8 orang (53%).
2. Tingkat nyeri pada lansia *Osteoarthritis* sebagian besar ada 11 orang (73%).
3. Ada perbedaan antara tingkat nyeri *Arthritis Rheumatoid* dengan *Osteoarthritis* pada lansia di Panti Tresna Werdha Hargodadali Surabaya

#### 6.2 Saran

1. Bidang Ilmu Keperawatan  
Memberikan pemahaman sekaligus menambah wawasan mengenai perbedaan antara penyakit rematik (*Arthritis*) dengan tingkat nyeri pada lansia
2. Pihak panti Tresna Werdha Hargodadali  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tenaga kesehatan mengenai perbedaan antara penyakit *Arthritis Rheumatoid* dan *Osteoarthritis* tingkat nyeri pada lansia di panti Tresna Werdha Hargodadali Surabaya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang akan datang untuk melakukan penelitian serupa hendaknya melakukan penelitian pada semua lansia, sehingga hasil penelitian lebih reseprentatif dalam menggambarkan semua perbedaan antara penyakit *Arthritis Rheumatoid* dan *Osteoarthritis*