

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan, hasil dan pembahasan telah dilakukan untuk menjawab pernyataan dan saran-saran yang sesuai dengan simpulan yang diambil, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini identifikasi faktor-faktor terjadinya ketuban pecah dini diantaranya yaitu pada pekerjaan , paritas, umur, riwayat ketuban pecah dini, infeksi, trauma, dan serviks inkompeten.
2. Mayoritas faktor pekerjaan menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu pada pekerjaan ibu rumah tangga dengan 15 responden (48,4%), faktor paritas menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu pada paritas multipara (2 sampai 4 kali) dengan 23 responden (74,2%), faktor umur menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu pada umur 27-30 tahun dengan 10 responden (32,3), faktor riwayat ketuban pecah dini menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu pernah mengalami riwayat ketuban pecah dini sebanyak 16 responden (51,6%), faktor infeksi menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu pada ibu hamil yang pernah mengalami infeksi sebanyak 23 responden (74,2%), faktor trauma menjadi faktor terjadinya ketuban pecah dini yaitu pada ibu hamil yang melakukan hubungan suami-

istri kurang dari 3 kali seminggu sehingga menyebabkan trauma pada kehamilannya sebanyak 29 responden (93,5%), dan pada faktor terjadinya ketuban pecah dini yang tidak mengalami serviks inkompetens atau kelainan otot-otot rahim ada 20 responden (64,5%).

3. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya ketuban pecah dini sebagian besar disebabkan oleh faktor trauma, paritas dan infeksi.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi ibu hamil

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi ibu hamil dalam mencegah terjadinya ketuban pecah dini dan hendaknya ibu hamil menyempatkan waktu untuk melakukan ANC (Ante Natal Care) secara teratur di pusat pelayanan kesehatan.

### 2. Bagi rumah sakit

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan agar rumah sakit dapat memberikan pendidikan dan mengevaluasi kejadian ketuban pecah dini

### 3. Bagi keperawatan

Perlu adanya penyuluhan dan peringatan pada ibu hamil untuk menghindari trauma, infeksi dengan keputihan atau kehamilan primipara serta multipara sebagai faktor resiko ketuban pecah dini.

### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan pada penelitian lebih lanjut dengan responden misalnya menghadapi kasus terjadinya ketuban pecah dini.