

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian pada hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan responden dalam mencegah penyalahgunaan Napza sebelum dan sesudah diberikan *health education* dengan metode *social support* pada komunitas anak jalanan di Taman Bungkul Surabaya mengalami perubahan dari kategori kurang menjadi cukup atau baik.
2. Sikap anak jalanan sebelum dan sesudah diberikan *health education* dengan metode *social support* dalam mencegah penyalahgunaan Napza pada komunitas anak jalanan di Taman Bungkul Surabaya memiliki perubahan sikap yang sebagian besar positif.
3. Terdapat pengaruh *health education* dengan metode *social support* dalam mencegah penyalahgunaan Napza pada komunitas anak jalanan di Taman Bungkul Surabaya.

5.2. Saran

1. Bagi Tenaga Keperawatan

Dalam memberikan *health education* dengan metode *social support* dalam mencegah penyalahgunaan Napza, perawat harus memperhatikan cara yang tepat dan menarik agar dapat dimengerti dan dipahami oleh responden seperti pemutaran video tentang akibat penyalahgunaan Napza mengingat responden dalam penelitian adalah anak – anak yang tidak mudah untuk memahami jika hanya materi yang diberikan tidak menarik.

2. Bagi Tempat Penelitian

Bagi tempat penelitian, diharapkan tidak hanya memberikan *health education* tetapi juga memantau pengetahuan dan sikap responden setelah diberikannya *health education* dengan metode *social support*.

3. Bagi Responden

Diharapkan responden dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari – hari, menambah wawasan tentang Napza dengan cara membaca atau bertanya kepada orang yang dipercaya seperti guru, dan mampu memilih teman untuk bergaul agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan Napza yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti menggunakan metode yang sama namun dengan jumlah responden yang lebih banyak dan lebih memperhatikan tempat yang digunakan selama penelitian, mengingat penelitian tidak dapat digeneralisasikan karena responden tidak mencukupi batas minimum dalam sebuah penelitian.