

## BAB 6

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Simpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari asuhan kebidanan pada Ny “E” dari pembahsan kesenjangan antara tinjauan pustakan dan tinjauan kasus pada kehamilan, persalinan, nifas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pengkajian data pada kehamilan di dapatkan ibu hamil dengan jarak anak  $\leq$  2 tahun. pada persalinan ibu dengan jarak  $<$  2 tahun di dapatkan keluhan pada ibu saat bersalin yaitu pengeluaran lendir bercampur darah (show), Waktu dan kekuatan kontraksi semakin bertambah, Rasa nyeri terasa di bagian belakang .
2. Diagnosa pada kasus ini yaitu GIIP<sub>10001</sub>, multi,UK 39 minggu 2 hari, hidup, tunggal, letak kepala, intra uterin, keadaan umum ibu dan janin baik dengan jarak  $<$  2 tahun. Jika dilihat dari kartu score Puji Rochjati ibu termasuk kehamilan resiko tinggi (KRT) dengan nilai 6.

Diagnosa pada kasus intranatal care yaitu didapatkan Diagnosa G2P<sub>10001</sub>, multi, tunggal, hidup, UK 39 minggu 2 hari, letak kepala, intra uteri, keadaan umum ibu dan janin baik. Kala 1 fase laten dengan jarak anak  $<$  2 tahun, Sedangkan pada kasus masalah yang ada yaitu ibu merasa cemas dalam menghadapi persalinannya

3. Pada langkah mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan dan nifas tidak ada masalah potensial.
4. Identifikasi perlunya tindakan segera oleh dokter/ bidan dan untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi yang dialami oleh kien. Pada kehamilan, persalinan dan

nifas tidak ada tindakan segera oleh dokter, sebab klien bersalin di BPS dan pada kehamilan, persalinan, nifas tidak ada penyulit atau masalah yang menyertai.

5. Pada langkah perencanaan asuhan yang menyeluruh. pada kehamilan, persalinan dan nifas telah dilakukan perencanaan sesuai dengan asuhan standart pelayanan kehamilan, asuhan persalinan normal, dan sesuai standart kunjungan nifas.
6. Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan nifas dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan karena pada persalinan sudah menyeluruh mengikuti 58 Asuhan Persalinan Normal (APN)
7. Setelah dilakukan evaluasi dari asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan dan nifas tidak terdapat kesenjangan karena klien kooperatif dalam setiap asuhan yang telah diberikan.

## **6.2 Saran**

Setelah penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Kebidanan Pada ibu dengan Jarak kehamilan < 2 tahun, penulis memberikan saran :

### **6.2.1 Bagi Tenaga Medis**

Dapat mempertahankan penatalaksanaan masalah kebidanan khususnya pada kehamilan, persalinan dan nifas dengan jarak anaka < 2 tahun yang diberikan sudah optimal dan berkualitas.

### **6.2.2 Bagi Institusi**

Mohon penambahan referensi buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ilmu kesehatan sehingga mempunyai wawasan yang luas.

### **6.2.3 Bagi Penulis**

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan asuhan kebidanan selanjutnya.

#### 6.2.4 Bagi Responden

Penulis sangat berharap pada ibu dan keluarga agar intervensi dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat memperbaiki kondisi yang ada agar dapat meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi.