

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah di sampaikan pada bab sebelumnya, maka di dapat kesimpulan dari tiap langkah asuhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1) Pengumpulan Data Dasar

Di dapatkan kesenjangan bahwa kenaikan total berat badan pasien pada kasus ini tidak mencapai kenaikan berat badan total yang diharapkan, tidak di lakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan hanya data terfokus, pemeriksaan laboratorium hanya 1 kali. Pada persalinan dan nifas tidak terdapat kesenjangan.

##### 2) Interpretasi Data Dasar

Dalam menentukan diagnose kehamilan, persalinan dan nifas sesuai dengan standar nomenklatur kebidanan yaitu Diagnosa kehamilan GII PI000I UK 37 minggu, hidup, tunggal, intrauterine, letkep  $\Psi$ , kesan jalan lahir normal, k/u ibu dan janin baik. Diagnosa persalinan GII PI000I UK 38-39 minggu, hidup, tunggal, intrauterine, letkep  $\Psi$ , jalan lahir normal, k/u ibu dan janin baik dengan inpartu kala I fase aktif. Sedangkan Diagnosa nifas P20002 ,post partum 12 jam. Dengan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan keluhan pasien dalam kasus ini tidak terdapat kesenjangan.

### 3) Mengidentifikasi Diagnosa Dan Masalah Potensial

Setelah di lakukan pengkajian pada kehamilan, persalinan, dan nifas tidak di dapat diagnosa dan masalah potensial sehingga tidak terdapat kesenjangan.

### 4) Mengidentifikasi Menetapkan Kebutuhan Segera

Setelah di lakukan pengkajian tidak ada diagnosa dan masalah potensial pada kehamilan, persalinan dan nifas sehingga tidak di perlukan penanganan segera

### 5) Perencanaan Asuhan Secara Menyeluruh

Perencanaan asuhan kebidanan yang di buat pada kehamilan, persalinan dan nifas sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan ibu, sehingga tidak terdapat kesenjangan.

### 6) Pelaksanaan Asuhan Perencanaan

Setelah di lakukan asuhan kebidanan pada kehamilan tidak di dapat kesenjangan, tetapi pada persalinan di dapatkan kesenjangan di antaranya, tidak melakukan kontak kulit dan IMD (langkah 32 Asuhan Persalinan Normal). Menimbang berat badan bayi, tetesi mata dengan salep mata, injeksi vit K (paha kiri) yang dilakukan pada kala IV di lakukan pada kala III. Pada nifas pada pemberian asuhan kunjungan.

### 7) Evaluasi

Dari hasil evaluasi yang telah di laksanakan dari asuhan yang menyeluruh dari kehamilan, persalinan dan nifas bahwa tidak terdapat kesenjangan.

## 5.2 Saran

Setelah Melakukan asuhan komprehensif pada Ny B maka pada kesempatan ini penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran antara lain :

### 1) Instansi Pelayanan

Instansi pelayanan disarankan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kebidanan yang terorganisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap asuhan kehamilan khususnya ibu hamil sehingga komplikasi-komplikasi dapat dicegah sedini mungkin.

### 2) Institusi Pendidikan

Di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan studi pustaka dan sumber penelitian selanjutnya.

### 3) Penulis

Sebagai calon tenaga kesehatan, maka mahasiswa disarankan untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standart praktik kebidanan, standart kompetensi bidan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.