

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari hubungan antara kadar kreatinin dengan kadar kalium pada pasien gagal ginjal kronik dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata kadar kreatinin pada pasien gagal ginjal kronik adalah 7,2 mg/dl.
2. Rata-rata kadar kalium pada pasien gagal ginjal kronik adalah 5,4 mmol/L.
3. Ada hubungan antara kadar kreatinin dengan kadar kalium pada pasien gagal ginjal kronik dengan nilai korelasi (r) 0,648 dimana meningkatnya kadar kreatinin disertai dengan meningkatnya kadar kalium.

6.2 Saran

1. Bagi Pasien Penderita Penyakit Ginjal

Pada pasien gagal ginjal kronik hasil kadar kreatinin-nya yang meningkat dengan gejala klinik mual, muntah, nafsu makan berkurang, pusing, sakit kepala, air kemih berkurang, maka pasien disarankan untuk memeriksakan kadar kalium-nya juga.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang mempunyai riwayat penyakit ginjal diharapkan memeriksakan kadar kreatinin dan kadar kalium.

3. Bagi Pegawai Laboratorium

Khususnya bagi petugas laboratorium agar dapat lebih meningkatkan ketrampilan dalam menangani sampel dan menambah pengetahuan bahwa ada hubungan antara meningkatnya kadar kreatinin dengan meningkatnya kadar kalium pada pasien gagal ginjal kronik.