

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan di rumah sakit Muhammadiyah Gresik. Data diambil sebanyak 30 pasien bayi baru lahir dengan indikasi ketuban pecah dini dapat diambil kesimpulan bahwa nilai  $\text{Chi } X^2 = 0,646$  yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan terhadap jumlah leukosit dengan kadar C-Reaktif Protein pada bayi baru lahir dengan indikasi ketuban pecah dini.

#### 6.2 Saran

##### 6.2.1 Bagi Masyarakat

1. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan – makanan yang bergizi.
2. Memeriksa kehamilan secara rutin.
3. Memeriksa bayi lahir yang terindikasi ketuban pecah dini

##### 6.2.2 Bagi Tenaga Medis

1. Perlunya memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya ibu hamil mengenai faktor dan gejala-gejala terjadinya ketuban pecah dini.
  2. Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan dengan hasil tidak ada hubungan, maka untuk tidak mewajibkan pemeriksaan C-Reaktif Protein sehingga bernilai ekonomi pada pasien.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- Untuk penelitian selanjutnya di harapkan bisa melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap bayi baru lahir dengan indikasi ketuban pecah dini.