

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan di sajikan kesimpulan hasil dan pembahasan tentang penelitian yang telah peneliti lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang diambil.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap Nn.F dan Ny.S didapatkan masalah keperawatan inti kedua kliennya itu perilaku kekerasan. Klien Nn.F dikarenakan adanya gangguan proses fikir/ halusinasi sedangkan pada Ny.S dikarenakan adanya gangguan isi pikir/ waham curiga. Dengan faktor predisposisi yang muncul pada kedua klien dikarenakan faktor biologik.
- 2) Berdasarkan respon atau hasil evaluasi setelah tindakan selama 6 hari dapat di simpulkan bahwa intervensi dalam bentuk strategi pelaksanaan yang terdiri dari 5 strategi pelaksanaan untuk klien dan 3 strategi pelaksanaan untuk keluarga yang dilakukan oleh peneliti dapat membantu klien dalam mengontrol perilaku kekerasan dengan hasil assesment teratasi sebagian.

5.2 Saran

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mampu memahami tentang perilaku kekerasan secara spesifik sehingga mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang tepat, dan

mampu mengimplementasikan berbagai intervensi yang dapat membantu klien dalam mengontrol perilaku kekerasannya.

2. Bagi Institusi

Diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih luas tentang perilaku kekerasan dan dapat lebih banyak menyediakan referensi-referensi buku tentang penyakit-penyakit, terapi serta asuhan keperawatan penyakit jiwa terlebih pada kasus perilaku kekerasan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar mampu memahami tentang perilaku kekerasan, penyebab, tanda gejala serta penanganan perilaku kekerasan secara umum untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka gangguan jiwa di masyarakat.

4. Bagi Klien

Diharapkan klien mampu mengenal dan mengontrol perilaku kekerasan sehingga membantu mempercepat proses penyembuhan dan dapat digunakan sebagai terapi yang tidak hanya di dapatkan di sarana kesehatan akan tetapi dapat digunakan ketika klien pulang.

