BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hasil Identifikasi Tanda-tanda vital dan berat badan pada pasien sebelum Hemodialisis di unit Hemodialisis RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang pada Ny. N yaitu TD 140/80 mmHg, Nadi 98 x/menit, RR 16x/menit, BB 70 kg. Sedangkan hasil Tanda-tanda vital dan berat badan pada pasien sebelum Hemodialisis di unit Hemodialisis RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang pada Ny. B yaitu TD 150/90 mmHg, Nadi 96 x/menit, RR 18x/menit, BB 67 kg.
2. Respon Penarikan Ultrafiltrasi saat proses Hemodialisis di unit Hemodialisis RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang yaitu terdapat perbaikan hemodinamik pada pasien Ny. N dan Ny. B. Proses hemodialisis pada kedua pasien dilakukan dengan QB awal 100 ml/menit dan QD 500 ml/mnt dan penanganan hipotensi sesuai dengan SOP yang dibuat. Selama proses hemodialisis berjalan lancar, sehingga pada akhir hemodialisis yaitu pukul 10.00 ultrafiltrasi tercapai sesuai dengan prescribe dokter.
3. Hasil Identifikasi Tanda-tanda vital dan berat badan pada pasien setelah Hemodialisis di unit Hemodialisis RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang pada Ny. N yaitu TD 120/80 mmHg, Nadi 80 x/menit, RR 18x/menit, BB 67 kg. Sedangkan hasil identifikasi Tanda-tanda vital dan berat badan pada pasien setelah Hemodialisis di unit Hemodialisis RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang pada Ny. B yaitu

TD 120/70 mmHg, Nadi 82 x/menit, RR 16x/menit, BB 65 kg. Selain itu terdapat penurunan berat badan dan berkurangnya edema yang dialami kedua pasien serta pasien mengatakan tidak ada keluhan setelah pelaksanaan hemodialisis berakhir.

5.2 Saran

1. Bagi Pasien dan Keluarga

   Diharapkan pasien dengan diagnosa medis Chronic Kidney Disease (CKD) stadium akhir mampu mengerti tentang penyebab penurunan tekanan darah yang dialami selama hemodialisis dan cara pencegahanya.

2. Bagi perawat

   Diharapkan dapat menjadikan informasi dasar dalam landasan bagi rumah sakit untuk menentukan standart operasional prosedur dalam pemberian asuhan keperawatan yang komprehensif, sehingga dapat bermanfaat bagi pasien dengan diagnosa medis Chronic Kidney Disease (CKD) stadium akhir yang menjalani hemodialisis.

3. Bagi penelitian selanjutnya

   Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penelitian menggunakan jumlah responden yang lebih banyak dan dengan menggunakan desain atau metode penelitian yang lebih baik.