

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 30 sampel penderita anemia di RS. Siti Khodijah Sepanjang dapat diambil kesimpulan, bahwa didapatkan hasil hitung rata-rata jumlah retikulosit 0,81 %. Persentase hasil hitung jumlah retikulosit yang normal 66,7 % atau sebanyak 20 orang, sedangkan hasil yang tidak normal 33,3 % atau sebanyak 10 orang.

5.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

- Bagi peneliti selanjutnya, diusahakan untuk melakukan uji coba
- a. Membandingkan pemeriksaan jumlah retikulosit dengan metode manual dan metode analyzer pada penderita anemia defisiensi besi.
 - b. Pemeriksaan jumlah retikulosit pada ibu hamil trisemester III.

2. Bagi institusi

Penelitian ini jauh dari sempurna, masih bisa dilanjutkan lagi agar bermanfaat bagi institusi yang lain, dan dapat menambah ilmu tentang retikulosit serta anemia.

3. Bagi masyarakat

Agar tidak mengalami anemia sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, bervitamin dan bergizi bagi tubuh. Serta melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui keadaan kesehatan kita.