

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan terhadap 112 data anak yang terdiagnosa SSD di RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data status gizi anak dalam penelitian ini sebagian besar adalah dengan status gizi lebih sebanyak 86 anak (76,8 %). Sedangkan sebagian kecil data berdasarkan status gizi anak dengan gizi buruk sebanyak 1 anak (0,9 %).
2. Berdasarkan data menurut diagnosa dalam penelitian ini sebagian besar adalah terjadi shock yaitu sebanyak 95 anak (84,8 %). Sedangkan yang non shock yaitu sebanyak 17 anak (15,2 %).
3. Terdapat hubungan antara status gizi lebih dengan kejadian SSD pada anak usia 1 – 12 tahun di RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang dengan $P = 0,000 < \alpha = 0,05$ (*Chi-Square Test*).

4.2 Saran

1. Bagi Tempat Penelitian
 - a) Mengembangkan dan memfasilitasi tenaga medis RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang untuk mendapatkan update ilmu terkini tentang penanganan shock khususnya pada anak guna tercapainya tujuan pelayanan prima di RS.
 - b) Meningkatkan pelayanan kegawatan shock yang terjadi pada anak

2. Bagi Peneliti Lain

Perlu penelitian dan pengembangan lebih lanjut mengenai penelitian ini dengan variable lain yang mempengaruhi terjadinya SSD, diantaranya jenis kelamin, usia, lingkungan rumah, jarak rumah ke RS terdekat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat tentang pencegahan DBD di lingkungan rumah masing – masing serta pentingnya dilakukan foging.