



BAB 5
HASIL PENELITIAN

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengambilan sampel melalui pengambilan data primer/sekunder yaitu dengan cara memberikan kuisisioner secara langsung kepada responden secara tertulis pada poli kandungan di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya. Peneliti menggunakan metode *Cross Sectional Study* yang bersifat analitik observasional menggunakan tehnik *Purposive Sampling* dengan *sample* sebanyak 96 orang pasien ibu hamil dan pasca melahirkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya pada bulan Agustus 2022.

5.2 Karakteristik Sampel di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya

Dibawah ini akan disajikan faktor pada penelitian yang dilakukan pada penelitian ini.

5.2.1 Usia Responden

Tabel 5.1 Distribusi Sampel Berdasarkan Usia Responden

Usia	Jumlah	%
18 Tahun – 24 Tahun	34	35,4%
25 Tahun - 35 Tahun	52	54,1%
Diatas 35 Tahun	10	10,4%
Total	96	100%

(Data Primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan hasil tersebut, jumlah responden paling banyak berdasarkan usia adalah 25 tahun sampai 35 tahun dengan jumlah 52 responden (54,1%) . Selanjutnya di posisi terbanyak kedua, dengan usia 18

sampai 24 tahun dengan jumlah 34 responden (35,4%). Dan dengan usia diatas 35 tahun menjadi frekuensi responden yang paling sedikit (10,4%).

5.2.2 Riwayat Trauma Psikologis

Tabel 5. 2 Distribusi Sample Berdasarkan Riwayat Trauma Psikologis

		Riwayat Trauma Psikologis			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Tidak Ada Riwayat Trauma	58	60.4%	60.4%	60.4
	Ada Riwayat Trauma	38	39.6%	39.6%	100.0
	Total	96	100.0	100.0	

(Data Primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi variabel ibu hamil dan pasca melahirkan yang tidak memiliki riwayat trauma psikologis lebih banyak yaitu sebesar 58 responden (60,4%). Sedangkan pada pasien yang memiliki riwayat trauma psikologis adalah sebesar 38 responden (39,6%).

5.2.3 Jenis Riwayat Trauma Psikologis yang dialami Responden

Tabel 5. 3 Distribusi Jenis Riwayat Trauma Psikologis yang dialami Responden

Jenis Trauma Psikologis	Jumlah	%
Kecelakaan Kerja / Kecelakaan Berkendara	31	32,2%
Bencana Alam	11	11,4%
Korban Kejahatan	3	3,1%
Kekerasan Fisik / Seksual Semasa Kecil	7	7,2%
Kekerasan Seksual Saat Dewasa	0	0
Kekerasan Fisik / Verbal Saat Dewasa	5	5,2%
Menyaksikan Pembunuhan	1	1,04%
Terluka Parah	1	1,04%
Orang Terdekat Meninggal / Mengalami Kekerasan	6	6,2%
Trauma Lain	0	0

Berdasarkan tabel diatas, hasil menunjukkan bahwa jumlah responden yang pernah memiliki riwayat trauma adalah sebanyak 38 Responden. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, jenis riwayat trauma yang paling banyak dialami oleh responden adalah trauma kecelakaan kerja atau kecelakaan berkendara dengan presentase sebesar 32,2%. Hasil jenis trauma terbanyak kedua adalah trauma bencana alam dengan presentase sebesar 11% . Sedangkan untuk hasil terkecil dari jenis trauma yang pernah dialami adalah kekerasan seksual saat dewasa dan trauma lain yaitu trauma yang tidak terdapat pada isian kuisioner.

5.2.4 Gejala Depresi Perinatal

Tabel 5. 4 Distribusi Sample Berdasarkan Gejala Depresi Perinatal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Ada Resiko Depresi	37	38.5	38.5	70.8
	Resiko Depresi Rendah	28	29.2	29.2	200.0
	Resiko Mengalami Depresi	31	32.3	32.3	32.3
	Total	96	100.0	100.0	

(Data Primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi variabel Gejala Depresi Perinatal pada ibu hamil dan pasca melahirkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya, memiliki frekuensi tidak ada resiko gejala depresi lebih banyak yaitu sebesar 37 responden (38,5%). Selanjutnya responden dengan resiko mengalami depresi sebesar 31 responden (32,3%). Dan pada responden dengan resiko depresi rendah sebanyak 28 responden (29,2%).

5.3 Hasil Analisis Hubungan Trauma Psikologis pada ibu hamil dengan gejala depresi perinatal

Tabel 5. 5 Hasil Analisis Korelasi Spearman

			Riwayat Trauma	Gejala Depresi
Spearman's rho	Riwayat Trauma	Correlation Coefficient	1.000	.069
		Sig. (2-tailed)	.	.503
		N	96	96
	Gejala Depresi	Correlation Coefficient	.069	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.025	.
		N	96	96

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel Trauma Psikologis pada Ibu Hamil dengan Gejala Depresi diperoleh koefisien korelasi $r = 0,069$; $p = 0,025$ ($p < 0,050$), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat Hubungan yang signifikan antara Trauma Psikologis pada Ibu Hamil dengan Gejala Depresi Perinatal di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya. Dari hasil analisis korelasi didapatkan korelasi antara Trauma Psikologis pada Ibu Hamil dengan Gejala Depresi adalah 0,069. Hal ini menunjukkan hubungan yang 'rendah' antara Trauma Psikologis pada Ibu Hamil dengan Gejala Depresi Perinatal di Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya.