



BAB 7
KESIMPULAN

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menemukan bahwa sebanyak 19 (44,2%) ibu hamil trimester I yang melakukan *antenatal care* (ANC) di Puskesmas Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro mengalami anemia, sedangkan 24 (55,8%) orang lainnya tidak mengalami anemia.
2. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan antara paparan asap rokok dengan anemia pada ibu hamil trimester I di Puskesmas Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, terbukti dengan nilai $p < 0,05$.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan adanya penelitian lebih dalam dengan memperluas sampel serta lebih memperhatikan variabel-variabel yang terkait. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut lagi mengenai persepsi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil.
2. Bagi Instansi Terkait
Saran untuk institusi pelayanan kesehatan terkait dalam hal ini terkhusus pada lokasi penelitian kami untuk dapat menjadikan hasil penelitian ini

sebagai sumber acuan dalam meningkatkan edukasi dan pemahaman kepada setiap ibu hamil terkait bahaya dari paparan asap rokok terkhusus bagi ibu hamil.

3. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih peduli mengenai dampak asap rokok khususnya pada ibu hamil. Hendaknya para perokok aktif lebih memperhatikan tempat dan keadaan lingkungan sekitar ketika sedang merokok agar orang lain tidak terdampak akibat paparan asap rokok dari perokok aktif khususnya ibu hamil.

