

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Karakteristik responden dari 74 sampel rekam medis menunjukkan bahwa mayoritas berusia 46-60 tahun.
2. Dari 74 pasien yang dinilai menggunakan kriteria skor *WHOQOL-BREF* sebagian besar menunjukkan kualitas hidup yang baik.
3. Dari 74 pasien yang di evaluasi menggunakan kriteria skor *Missoula* sebagian besar menunjukkan kualitas hidup yang baik.
4. Berdasarkan hasil analisis perbandingan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam kualitas hidup pada pasien yang menjalani terapi hemodialisis reguler yang diukur dengan menggunakan instrumen *World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF)* dan *Missoula-VITAS Quality of Life Index (MVQOLI)*.

7.2 Saran

1. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada pasien hemodialisis reguler dengan mengintegrasikan penggunaan *score World Health Organization-BREF* dan *Missoula score* sebagai alat evaluasi rutin untuk memantau dan meningkatkan kualitas hidup pasien hemodialisis.



2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan evaluasi terkait kualitas hidup serta melakukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor multidimensional dalam pengukuran kualitas hidup pasien hemodialisis.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas hidup bagi pasien hemodialisis dan bagaimana skor evaluasi seperti *World Health Organization-BREF* dan *Missoula score* dapat membantu meningkatkan perawatan mereka.



Universitas Muhammadiyah Surabaya

