

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pada karakteristik responden, didapatkan sedikit lebih banyak responden berjenis kelamin perempuan (54,8%) dibanding responden laki-laki (45,2%), lebih banyak responden dengan usia ≥ 50 tahun (78,6%) dibanding responden dengan usia ≤ 50 tahun (21,4%), dan lebih banyak responden yang berasal dari poli saraf (92,9%) dibandingkan dengan responden yang berasal dari non-poli saraf (7,1%).
2. Lebih banyak responden yang diresepkan dengan satu variasi OAINS (88,1%) dibanding responden yang diresepkan dengan lebih dari satu variasi OAINS (11,9%). Sedikit lebih banyak pasien yang menggunakan OAINS dengan durasi jangka pendek (54,8%) dibandingkan pasien yang menggunakan OAINS dengan durasi jangka panjang (45,2%). Responden yang menggunakan OAINS dengan durasi jangka panjang lebih banyak terdapat pada responden dengan jenis kelamin laki-laki (21,4%), pada responden dengan usia ≥ 50 tahun (28,6%), pada responden dari poli saraf (35,7%), serta pada responden dengan riwayat diresepkan satu variasi OAINS (31,0%).

3. Sedikit lebih banyak responden yang terdiagnosis tidak GERD (61,9%) dibanding responden yang terdiagnosis GERD (38,1%).
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin terhadap GERD ($p=0,261$), tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia terhadap GERD ($p=0,224$), terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok diagnosis terhadap GERD ($p=0,027$) dengan rincian lebih banyak pasien poli saraf yang terdiagnosis GERD daripada pasien non poli saraf, serta terdapat hubungan yang signifikan antara tipe OAINS terhadap GERD ($p=0,002$) dengan rincian lebih banyak pasien dengan satu variasi OAINS yang terkena GERD daripada pasien dengan lebih dari satu variasi OAINS.
5. Terdapat hubungan antara penggunaan jangka panjang OAINS terhadap GERD pada pasien poliklinik di Rumah Sakit Amelia Pare ($p=0,000$).

7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode *simple random sampling* agar tidak terjadi bias penelitian yang tinggi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan pengambilan data lebih awal dan jika ingin melakukan pengambilan data melalui telepon, maka peneliti dapat mengirimkan pesan kepada responden terlebih dahulu sebelum menghubungi via telepon.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan beberapa variabel perancu yang belum tertera dalam penelitian ini.

