




**BAB III**  
**KERANGKA KONSEPTUAL**  
**DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel bebas (motivasi, pengetahuan, sikap, jenis kelamin, lama menderita diabetes melitus) dengan variabel terikat (kepatuhan minum obat).



**Gambar 3.1** Kerangka Konseptual Penelitian

### 3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada Health Belief Model yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi, keyakinan, dan faktor pendorong yang dapat menjadi sasaran intervensi. Variabel pengetahuan, motivasi, dan sikap dipertahankan karena berperan dalam membentuk kepatuhan pengobatan, yaitu pengetahuan meningkatkan pemahaman pasien mengenai penyakit dan terapi, motivasi sebagai dorongan internal menjalani pengobatan jangka panjang, serta sikap mencerminkan persepsi terhadap manfaat dan hambatan terapi. Faktor pemicu tindakan (cues to action) seperti edukasi tenaga kesehatan, dukungan keluarga, dan pengalaman sakit dapat mendorong pasien melakukan pengobatan secara teratur. Variabel non-modifiable seperti jenis kelamin dan lama menderita tetap ditampilkan sebagai faktor teoritis namun tidak dianalisis karena penelitian berfokus pada faktor yang dapat dimodifikasi melalui intervensi kesehatan. Kepatuhan minum obat diukur menggunakan MMAS-8 sebagai instrumen penilaian perilaku kepatuhan pasien. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada faktor perilaku yang dapat ditingkatkan serta memiliki implikasi praktis dalam penyusunan edukasi kesehatan, penguatan motivasi, dan peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien diabetes melitus tipe 2.

### 3.3 Hipotesis Penelitian

H0: Tidak terdapat hubungan antara motivasi, pengetahuan, dan sikap dengan tingkat kepatuhan minum obat pada penderita diabetes melitus tipe 2.

H1: Terdapat hubungan antara motivasi, pengetahuan, dan sikap dengan tingkat kepatuhan minum obat pada penderita diabetes melitus tipe 2.

