


BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual



Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

- : Variabel Dependen
- : Variabel Independen
- ↘ : Menyebabkan

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Terjadinya preeklamsia penyebabnya banyak dan belum pasti antara lain umur, obesitas, gaya hidup, riwayat preeklamsia, dan lainnya. Tetapi salah satunya adalah disfungsi

Endotel yang di sebabkan karena gagalnya invasi trofoblast ke arteri spiralis. Dari disfungsi endotel itu dapat menyebabkan penurunan fungsi beberapa organ dan system. Penurunan fungsi beberapa organ itu dapat mempengaruhi penurunan trombosit. Pasien preeklamsia maupun eklampsia mengalami yang mengalami penurunan trombosit menyebabkan trombositopenia. Pada kerangka konseptual sudah di jelaskan bahwasannya pada penelitian ini akan melihat perbandingan trombosit pada ibu hamil Preeklamsia dengan eklampsia Dengan adanya penelitian ini diharapkan pada saat sebelum melahirkan dapat dilakukan terapi yang sesuai untuk mencegah help syndrome.

3.3 Hipotesis

H0 : Ada perbedaan kadar trombosit antara pasien preeklamsia dengan eklampsia di rumah sakit Wiyung Sejahtera

H1 : Tidak ada perbedaan kadar trombosit antara pasien preeklamsia dengan eklampsia di rumah sakit Wiyung Sejahtera