

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam boiler terhadap pertumbuhan cabai merah (*Capsicum annuum L.*).
2. Ada pengaruh pemberian pupuk kotoran kambing gibas terhadap pertumbuhan cabai merah (*Capsicum annuum L.*).
3. Pertumbuhan cabai merah (*Capsicum annuum L.*) dengan menggunakan pupuk kotoran ayam boiler menunjukkan rata-rata 14,82 cm, sedangkan pertumbuhan cabai merah (*Capsicum annuum L.*) dengan menggunakan kotoran kambing gibas menunjukkan rata-rata 15,96 cm.

#### 5.2 SARAN

1. Bagi masyarakat dianjurkan memakai kotoran kandang sebagai pupuk pengganti pupuk anorganik untuk tanaman berjenis sayuran.
2. Dapat menambah dosis pupuk kandang yang digunakan sebelumnya oleh peneliti.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya diterapkan pengukuran produksi tanaman cabai merah (*Capsicum annuum L.*).