




BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL DAN
HIPOTESIS PENELITIAN

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Operasi regio supraumbilical dilakukan dengan pemberian anestesi sebelum tindakan pembedahan. Dengan kriteria pasien dewasa usia 18-50 tahun, status

fisik sehat, sakit bawaan ringan hingga sedang (status ASA 2 dan 3), dan bersedia dengan tindakan anestesi. Pemilihan metode anestesi yang digunakan yaitu *high* spinal anestesi dan general anestesi. Tingginya blokade dipengaruhi oleh dosis dan jenis obat anestesinya. Pada spinal anestesi, pasien akan tetap sadar namun tidak merasakan sakit atau nyeri pada area pembedahan. Sedangkan general anestesi dilakukan untuk membuat pasien hilang kesadaran dan tidak merasakan nyeri sama sekali saat operasi berlangsung. Pada general anestesi, pasien memang dirasa nyaman karena tidak mau tahu mengenai nyeri atau sakitnya selama tindakan operatif. Namun, apakah yang nyaman sudah pasti aman. Efek yang muncul dari kedua metode tersebut bisa saja berbeda, sehingga akan dilakukan penilaian mana yang lebih baik dari segi *efficacy*, *safety*, dan *economic*.

3.3 Hipotesis Penelitian

H0 (1) :

- Tidak ada perbedaan *efficacy* metode *high* spinal anestesi dan general anestesi untuk operasi regio supraumbilical pada pasien BPJS di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang.

H1 (1) :

- Ada perbedaan *efficacy* metode *high* spinal anestesi dan general anestesi untuk operasi regio supraumbilical pada pasien BPJS di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang.

H0 (2) :

- Tidak ada perbedaan *safety* metode *high* spinal anestesi dan general anestesi untuk operasi regio supraumbilical pada pasien BPJS di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang.

H1 (2) :

- Ada perbedaan *safety* metode *high* spinal anestesi dan general anestesi untuk operasi regio supraumbilical pada pasien BPJS di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang.

H0 (3) :

- Tidak ada perbedaan *economic* metode *high* spinal anestesi dan general anestesi untuk operasi regio supraumbilical pada pasien BPJS di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang.

H1 (3) :

- Ada perbedaan *economic* metode *high* spinal anestesi dan general anestesi untuk operasi regio supraumbilical pada pasien BPJS di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Sepanjang.

